

大腸がん

レジメン名 (更新日)	薬剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
mFOLFOXIRI (2020/8/1)	イリノテカン レボホリナートCa オキサリプラチン フルオロウラシル	150mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1時間 2時間 2時間 46時間	day1 day1 day1 day1	14日
mFOLFOXIRI+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ イリノテカン レボホリナートCa オキサリプラチン フルオロウラシル	5mg/kg 150mg/m ² 200mg/m ² 85mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	90-30分 1時間 2時間 2時間 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日
mFOLFOX6 (2020/8/1)	レボホリナートCa オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1	14日
mFOLFOX6+パニツムマブ (2020/8/1)	パニツムマブ レボホリナートCa オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1時間 2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日
mFOLFOX6+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ レボホリナートCa オキサリプラチン フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m ² 85mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	90~30分 2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日
CapeOX (XELOX) (2020/8/1)	オキサリプラチン カペシタビン	130mg/m ² 2,000mg/m ²	点滴静注 内服	2時間 1日2回 朝夕食後	day1 day1~14	21日
CapeOX+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ オキサリプラチン カペシタビン	7.5mg/kg 130mg/m ² 2,000mg/m ²	点滴静注 点滴静注 内服	90~30分 2時間 1日2回 朝夕食後	day1 day1 day1~14	21日
SOX (2020/8/1)	オキサリプラチン テガフル /ギメラシル /オテラシル	130mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 内服	2時間 1日2回 朝夕食後	day1 day1~14	21日
SOX+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ オキサリプラチン テガフル /ギメラシル /オテラシル	7.5mg/kg 130mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 点滴静注 内服	90~30分 2時間 1日2回 朝夕食後	day1 day1 day1~14	21日
FOLFILI (2020/8/1)	レボホリナートCa イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1	14日
FOLFILI+パニツムマブ (2020/8/1)	パニツムマブ レボホリナートCa イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	6mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1時間 2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日
FOLFILI+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ レボホリナートCa イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	5mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	90~30分 2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日

大腸がん

レジメン名 (更新日)	薬剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
FOLFILI+ラムシルマブ (2020/8/1)	ラムシルマブ レボホリナートCa イリノテカン フルオロウラシル フルオロウラシル	8mg/kg 200mg/m ² 150mg/m ² 400mg/m ² 2,400mg/m ²	点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注 点滴静注	1時間 2時間 2時間 10分 46時間	day1 day1 day1 day1 day1	14日
XELIRI (2020/8/1)	イリノテカン カペシタビン	150mg/m ² 1600mg/m ²	点滴静注 内服	90分 1日2回 朝夕食後	day1 day1~14	21日
XELIRI+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ イリノテカン カペシタビン	7.5mg/kg 150mg/m ² 1,600mg/m ²	点滴静注 点滴静注 内服	90~30分 90分 1日2回 朝夕食後	day1 day1 day1~14	21日
IRIS (2020/8/1)	イリノテカン テガフル /ギメラシル /オテラシル	150mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 内服	90分 1日2回 朝夕食後	day1 day1~14	14日
IRIS+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ イリノテカン テガフル /ギメラシル /オテラシル	7.5mg/kg 150mg/m ² 80mg/m ²	点滴静注 点滴静注 内服	90~30分 90分 1日2回 朝夕食後	day1 day1 day1~14	14日
カペシタビン+ベバシズマブ (2020/8/1)	ベバシズマブ カペシタビン	7.5mg/kg 1,000mg/m ²	点滴静注 内服	90~30分 1日2回 朝夕食後	day1 day1~14	21日
パニツムマブ単独 (2020/8/1)	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注	1時間	day1	14日