

# 乳がん

レジメン名 (更新日)	薬剤名	用量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
weekly nab-PTX (2020/8/1)	nab-パクリタキセル	100mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day1	7日
nab-PTX (2020/8/1)	nab-パクリタキセル	260mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day1	21日
TC(DTX+CPA) (2020/8/1)	ドセタキセル シクロホスファミド	75mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	1時間 1時間	day1 day1	21日
wPTX (2020/8/1)	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	1時間	day1	7日
wPTX+BV (2020/8/1)	パクリタキセル ベバシズマブ	80mg/m <sup>2</sup> 10mg/kg	点滴静注 点滴静注	1時間 90～30分	day1,8,15 day1,15	28日
EC (2020/8/1)	エピルビシン シクロホスファミド	90mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注	60～15分 60～30分	day1 day1	21日
FEC (2020/8/1)	エピルビシン シクロホスファミド フルオロウラシル	100mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup> 500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注	60～15分 60～30分 60～15分	day1 day1 day1	21日
DTX (2020/8/1)	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	60分	day1	21日
エリブリン (2020/8/1)	エリブリン	1.4mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	day1,8	21日
ビノレルビン (2020/8/1)	ビノレルビン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	5分	day1,8	21日
トラスツズマブ (2020/8/1)	トラスツズマブ	初回8mg/kg 以降6mg/kg	点滴静注	90～60分	day1	21日
ペルツズマブ +トラスツズマブ +DTX (2020/8/1)	ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	840mg→420mg 8mg/kg→6mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注	90～30分 90～30分 60分	day1 day1 day1	21日
ペルツズマブ +トラスツズマブ +PTX (2023/3/1)	ペルツズマブ トラスツズマブ パクリタキセル	840mg→420mg 8mg/kg→6mg/kg 80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注 点滴静注 点滴静注	90～30分 90～30分 30分	day1 day1 day1,8,15	21日
トラスツズマブ エムタンシン (2020/8/1)	トラスツズマブ エムタンシン	3.6mg/kg	点滴静注	90～30分	day1	21日
ゲムシタビン (2020/8/1)	ゲムシタビン	1,250mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	30分	day1,8	21日